

Mitarbeiterinformation:
Empfohlene Impfungen in Gemeinschaftseinrichtungen

IMPfung	WESHALB?	WIE OFT?	ANMERKUNG
Tetanus/ Diphtherie	Vorbeugend gegen Wundstarrkrampf	Grundimmunisierung umfasst 4 Impfungen im Abstand von 1; 1 und 12 Monaten, danach alle 10 Jahre	
Polio	Derzeit nur außerhalb Europa vorkommend. 4 Impfungen reichen aus	Grundimmunisierung umfasst 3 Impfungen im Abstand von 2 und 12 Monaten, danach alle 10 Jahre Auffrischung	
Masern/Mumps/Röteln	Missbildungsgefahr des ungeborenen Kindes/ Totgeburt bei Infektion während der Schwangerschaft	Kombinationsimpfung erhältlich. Zwei Impfungen im Kindesalter oder einer als Erwachsener.	Gesonderte Anmerkung zu Masern im nächsten Feld
MASERN	die ausreichenden Masernimpfungen sind <u>vor Beginn der Tätigkeit vorzuweisen (IfSG §20)</u>. Entweder durch Kopie des Impfausweises oder durch die Kopie einer durchgeführten Immunitätsbestimmung. Eine ggf. nötige Immunitätsbestimmung oder Impfung wird vom <u>Hausarzt</u> durchgeführt.		
Windpocken	Missbildung / Totgeburt bei Infektion in der Schwangerschaft, schwere Krankheitsverläufe im Erwachsenenalter	Lebenslange Immunität bei durchgemachter Erkrankung als Kind. Insgesamt sind 2 Impfdosen nötig, um Immunität zu erlangen.	
Pertussis (Keuchhusten)	Bei Säuglingen häufig tödliche Krankheitsverläufe, im Erwachsenenalter sehr schwere Erkrankung	Kombinationsimpfstoff vorhanden, nach Grundimmunisierung alle 10 Jahre Auffrischung	
Hepatitis A	Schwere Leberentzündung, Ansteckung über Körperausscheidungen (Windelwechsel, Toilettenbegleitung)	Grundimmunisierung umfasst 2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten, danach alle 10 Jahre Auffrischung	Sofern Sie nicht geimpft sind, wird Ihnen der arbeitsmedizinische Dienst (BAD) ggf. anbieten sich impfen zu lassen. Bitte überlegen Sie sich bereits vorher, ob Sie dies möchten und führen diese Impfung nach Möglichkeit direkt vor Ort durch.
Hepatitis B	Häufig chronisch verlaufende Leberentzündung, Ansteckung erfolgt über Blut, bei Betreuung behinderter Menschen empfohlen	Grundimmunisierung umfasst drei Impfungen im Abstand von 1,5 und 6 Monaten, danach alle 10 Jahre auffrischen. Kombinationsimpfstoff Hep. A/B vorhanden	